


៤. មធ្យោបាយពន្យារកំណើត អចិន្ត្រៃយ៍



- + ការចោះចងដៃស្បូន
 - ▶ គឺការចោះរន្ធគ្រូចមួយនៅលើពោះ ដើម្បីរកដៃស្បូនទាំងពីរ ចងនិងកាត់ផ្តាច់ម្តងមួយៗ។ ការចោះនេះត្រូវប្រើថ្នាំស្តីកត្រង់កន្លែងចោះ។ សមស្របចំពោះស្ត្រីដែលមិនចង់បានកូនទៀត ឬ មានបញ្ហាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។
- + ការចោះចងបំពង់បង្ហូរមេជីវិតឈ្មោល
 - ▶ គឺជាការចោះរន្ធគ្រូចមួយនៅលើស្បែកពងស្វាស ដើម្បីរកបំពង់បង្ហូរមេជីវិតឈ្មោលទាំងពីរ រួចចងនិងកាត់ផ្តាច់ម្តងមួយៗ ការចោះនេះត្រូវប្រើថ្នាំស្តីក។ សមស្របចំពោះបុរសដែលមិនចង់បានកូនទៀត ឬមួយក៏ដៃគូរបស់គាត់មានបញ្ហាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។

**មុននឹងប្រើសូមទៅពិគ្រោះជាមួយ
អ្នកផ្តល់សេវានៅមណ្ឌលសុខភាព ឬមន្ទីរពេទ្យ**

ឯកសារយោង

- ពិធីសារជាតិស្តីអំពីការពន្យារកំណើត ឆ្នាំ២០១៦ ជាភាសាខ្មែរ / ក្រសួងសុខាភិបាល / កម្មវិធីជាតិសុខភាពបន្តពូជ
- សៀវភៅបិទលើកស្តីអំពីការពន្យារកំណើត ឆ្នាំ២០១០ ជាភាសាខ្មែរ / ក្រសួងសុខាភិបាល / កម្មវិធីជាតិសុខភាពបន្តពូជ

ព័ត៌មានរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធ
និងធាតុស្ត្រីវិទ្យាកម្ពុជា
គេហទំព័រ: www.scgo-kh.com

ផលិតដោយ SCGO
ឧបត្ថម្ភដោយ JSOG, NCGM, and JICA
បោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ២០១៨
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

មានកូនតាមប្រាថ្នា ប្រសើរជាងមានកូនដោយចៃដន្យ

ការពន្យារ កំណើត



សារៈប្រយោជន៍នៃការពន្យារកំណើត

- ម្តាយ និងកូនមានសុខភាពល្អ
- ឪពុក ម្តាយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ថែទាំកូនឱ្យបានល្អ
- កូនអាចបោះដោះម្តាយបានយូរ
- គ្រួសារមានពេលប្រកបមុខរបរ និងមានជីវភាពធូរធារ
- កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពេលសម្រាល និងក្រោយសម្រាល
- គ្រួសារដែលមានកូនរង្វើល មានសុខភាពល្អ មានជីវភាពធូរធារ និងមិនសូវមានបញ្ហា
- បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពីការមានផ្ទៃពោះដែលមិនចង់បាន និងជៀសវាងការរំលូតកូនដែលមិនមានសុវត្ថិភាព។

ការពន្យារកំណើត

គឺជាការជ្រើសរើសចំនួនកូនក្នុងគ្រួសារ និងការពន្យារពេលពីកំណើតកូនមួយ ទៅកំណើតកូនមួយទៀត រយៈពេលពេញវ័យយ៉ាងតិច។

មធ្យោបាយពន្យារកំណើតមានច្រើនប្រភេទគឺ ៖

១. មធ្យោបាយបាំង :


ស្រោមអនាម័យសំរាប់បុរស



- ជាបំពង់កៅស៊ូស្តើងមានចុងម្ខាងបិទជិត ដែលប្រើដោយបុរសនៅពេលរួមភេទ។
- ស្រោមអនាម័យមួយអាចប្រើបានតែម្តងគត់
- ប្រើស្រោមអនាម័យមិនធ្វើឱ្យស្ត្រីរលាកស្បូនទេ
- មានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលពាក់ស្រោមអនាម័យបានត្រឹមត្រូវ
- ការពារការមានផ្ទៃពោះ ជំងឺកាមរោគ និងជំងឺអេដស៍

២. មធ្យោបាយដែលមានជាតិអ័រម៉ូន :

ថ្នាំគ្រាប់



- + ថ្នាំ១បន្ទះមាន២៨គ្រាប់ អាចការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះបាន១ខែ។
- ត្រូវលេបថ្នាំ១ថ្ងៃ១គ្រាប់តាមសញ្ញាព្រួញរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងម៉ោងដដែល
- ស្ត្រីនឹងមានកូនវិញក្រោយពីឈប់លេបថ្នាំ
- ធ្វើឱ្យឈាមរដូវទៀងទាត់ ២៨ថ្ងៃ
- អាចកាត់បន្ថយភាពស្លេកស្លាំង ជុំកន្សោមពងជំងឺមហារីកកន្សោមពង ស្រទាប់ក្នុងនៃស្បូន និងរលាកអាងត្រគាក

ថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់

ថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ គឺជាថ្នាំគ្រាប់ដែលគេប្រើភ្លាមៗ ក្នុងអំឡុងពេល៧២ម៉ោង បន្ទាប់ពីមានការរួមភេទដែលមិនបានការពារ។ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រសិនបើឆាប់ប្រើក្រោយការរួមភេទដែលមិនបានការពារ ឬត្រូវបានគេចាប់រំលោភ។



ប៉ុន្តែ មិនអាចប្រើជាមធ្យោបាយពន្យារកំណើតជាប្រចាំបានទេ មិនអាចការពារការឆ្លងរោគតាមផ្លូវបន្តពូជ និងមិនអាចប្រើជាមធ្យោបាយរំលូតកូនទេ។

ថ្នាំចាក់

- + ថ្នាំចាក់ គឺជាថ្នាំមានជាតិអ័រម៉ូនប្រូសេស្តែរ៉ូស តែមួយមុខ ១៥០ម.ក្រ។ ថ្នាំពន្យារកំណើត ១ម្តង
- អាចការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះបាន៣ខែ
- មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រសិនបើប្រើបានត្រឹមត្រូវ
- មិនរំខានដល់ការរួមភេទ
- ស្ត្រីអាចបាត់ឈាមរដូវមួយរយៈ ក្រោយពីចាក់ថ្នាំតែមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេ
- អាចកាត់បន្ថយភាពស្លេកស្លាំង
- ជួយការពារស្ត្រីកុំឱ្យមានជំងឺមហារីកមួយចំនួន (កន្សោមពង ស្រទាប់ក្នុងនៃស្បូន)
- អាចការពារស្ត្រីមិនឱ្យមានជំងឺរលាកអាងត្រគាក



៣. មធ្យោបាយពន្យារកំណើត មានរយៈពេលយូរ

កងដាក់ក្រោមស្បែក




កងដាក់ក្រោមស្បែកគឺជាបំពង់ស៊ីលីកូន ដែលមានផ្ទុកជាតិអ័រម៉ូន ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្រោមស្បែកផ្នែកខាងក្នុងនៃដើមដៃ។

កងដាក់ក្រោមស្បែកមានច្រើនប្រភេទ ដូចជា ៖ ចាខែល (Jadelle) ជាបំពង់តូចឆ្មារ មានចំនួន២ដើម អាចការពារមិនឱ្យមានកូនរយៈពេល៥ឆ្នាំ។ ចំណែកឯអ៊ីមផ្លាណុន (Implanon) ជាបំពង់តូចឆ្មារ ទន់ អាចបត់បែនបាន មានចំនួន១ដើម អាចការពារមិនឱ្យមានកូនរយៈពេល៣ឆ្នាំ។ ស្ត្រីអាចធ្វើការងារដូចធម្មតា ស្ត្រីអាចមានរដូវមិនទៀងទាត់ ឬអាចបាត់ឈាមរដូវមួយរយៈ។

កងដាក់ក្នុងស្បូន (TCu 380A)

កងTCu 380A មានរាងដូចអក្សរតេ "T" ជារត្នូប្លាស្ទិកតូច អាចបត់បែនបាន។ នៅដៃសងខាងនៃអក្សរតេ "T" និងនៅលើក្តី មានខ្សែទង់ដែង មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ អាចការពារការមានផ្ទៃពោះបានរហូតដល់១០ឆ្នាំ។



- មិនរំខានដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ត្រី
- មិនរំខានដល់ការរួមភេទ
- អាចការពារជំងឺមហារីកស្រទាប់ក្នុងនៃស្បូន
- អាចមានឈាមរដូវច្រើនជាងមុន (បរិមាណច្រើន និងរយៈពេលវែង)